

Návod k použití přípravku Kesimpta v předplněné injekční stříkačce

Před podáním injekce přípravku Kesimpta je důležité pochopit a dodržovat tento návod k použití. Před prvním použitím přípravku Kesimpta se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pamatujte:


- **Nepoužívejte** předplněnou injekční stříkačku Kesimpta, pokud je porušena pečeť na vnější krabičce nebo blistru. Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku Kesimpta v uzavřené krabičce, dokud nebudete připraveni ji použít.
- Předplněnou injekční stříkačkou Kesimpta **netřepejte**.
- Předplněná injekční stříkačka je vybavena ochranou jehly, která automaticky po dokončení injekce zakryje jehlu. Ochrana jehly pomáhá zabránit poranění jehlou každému, kdo po podání injekce manipuluje s předplněnou injekční stříkačkou.
- Nesnímejte kryt jehly dříve než těsně před podáním injekce.
- Před použitím se nedotýkejte křídel krytu stříkačky. Pokud se jich dotknete, může dojít k zakrytí jehly příliš brzy.
- Nepoužívejte předplněnou injekční stříkačku, pokud spadla na tvrdý povrch nebo spadla po odstranění krytu jehly.
- Použitou předplněnou injekční stříkačku Kesimpta ihned po použití zlikvidujte. **Nepoužívejte znovu předplněnou injekční stříkačku Kesimpta.** Viz „Jak mám zlikvidovat použitou předplněnou injekční stříkačku přípravku Kesimpta?“ na konci tohoto návodu k použití.

Jak mám uchovávat přípravek Kesimpta?

- Uchovávejte krabičku s předplněnou injekční stříkačkou přípravku Kesimpta v chladničce mezi 2° C a 8° C.
- Uchovávejte předplněnou injekční stříkačku Kesimpta v původní krabičce, dokud nebudete připraveni k použití, aby byl přípravek chráněn před světlem.
- **Chraňte** předplněnou injekční stříkačku přípravku Kesimpta **před mrazem**.

Uchovávejte přípravek Kesimpta mimo dohled a dosah dětí.

Součásti předplněné stříkačky přípravku Kesimpta (viz obrázek A):




Co potřebujete pro podání injekce:

Krabička obsahuje:

- Novou předplněnou stříkačku přípravku Kesimpta

Krabička neobsahuje (**viz obrázek B**):

- 1 polštářek napuštěný alkoholem
- 1 smotek vaty nebo gázy
- kontejner na ostré předměty



Viz „Jak mám zlikvidovat použitou předplněnou injekční stříkačku přípravku Kesimpta?“ na konci tohoto návodu k použití.

Příprava předplněné stříkačky přípravku Kesimpta

Krok 1. Najděte čistou, dobře osvětlenou, rovnou pracovní plochu

Krok 2. Vyjměte krabičku obsahující předplněnou injekční stříkačku přípravku Kesimpta z chladničky a nechte ji **neotevřenou** na pracovní ploše asi 15 až 30 minut, aby dosáhla pokojové teploty.


Krok 3. Umyjte si dobře ruce mýdlem a vodou.

Krok 4. Vyjměte předplněnou injekční stříkačku z krabičky a vyjměte ji z blistru přidržením těla krytu stříkačky.

Krok 5. Podívejte se do okénka na předplněnou injekční stříkačku. Kapalina uvnitř má být čirá až mírně opalizující. V kapalině můžete vidět malou vzduchovou bublinu, což je normální. Předplněnou injekční stříkačku **nepoužívejte**, pokud kapalina obsahuje viditelné částice nebo je zakalená.

Krok 6. **Nepoužívejte** předplněnou injekční stříkačku, pokud je poškozená. Předplněnou injekční stříkačku a balíček, který byl dodán, vraťte do lékárny.


Krok 7. Předplněnou injekční stříkačku **nepoužívejte**, pokud uplynula doba použitelnosti (**viz obrázek C**). Vraťte předplněnou předplněnou injekční stříkačku a její obal do lékárny.




Vyberte a očistěte místo vpichu

- Mezi oblasti Vašeho těla, které můžete použít k injikování přípravku Kesimpta, patří:
 - přední část stehen (**viz obrázek D**)
 - spodní část břicha (podbříšek), ale ne oblast 5 cm kolem pupku (**viz obrázek D**)
 - horní část paže, pokud vám injekci podává ošetřovatel nebo zdravotnický pracovník (**viz obrázek E**).

Obrázek D



Obrázek E
(pouze ošetřovatel nebo zdravotnický pracovník)




- Při každém podání injekce přípravku Kesimpta zvolte jiné místo.
- **Neaplikujte** do oblastí, kde je kůže citlivá, pohmožděná, zarudlá, šupinatá nebo tvrdá. Vyhýbejte se oblastem s jizvami, striemi nebo infikovanými místy.

Krok 8. Krouživým pohybem očistěte místo vpichu tamponem napuštěným alkoholem. Před podáním injekce nechte místo vpichu zaschnout. Před podáním injekce se již nedotýkejte očištěné oblasti.

Podání injekce


Krok 9. Opatrně sejměte kryt jehly z předplněné injekční stříkačky (**viz obrázek F**). Zlikvidujte kryt jehly. Na konci jehly můžete vidět kapku tekutiny. To je normální.

Obrázek F




Krok 10. Jednou rukou jemně sevřete kůži v místě vpichu. Druhou rukou zasuňte jehlu do kůže, jak je znázorněno (**viz obrázek G**). Zatlačte jehlu úplně dovnitř, abyste se ujistili, že si podáte celou dávku.

Obrázek G



Krok 11. Rukojeť předplněné stříkačky držte podle obrázku (**viz obrázek H**). Pomalu zatlačte na píst až na doraz, aby byla hlava pístu zcela mezi křídly krytu stříkačky.


Obrázek H



Krok 12. Pokračujte v úplném stisknutí pístu 5 sekund, přitom držte stříkačku na místě.

Krok 13. **Pomalů** uvolňujte píst, dokud není jehla zakryta (**viz obrázek I**), a poté vyjměte stříkačku z místa vpichu.

Obrázek I



Krok 14. V místě vpichu může být malé množství krve. Na místo vpichu můžete přitlačit vatový tampon nebo gázu a držet ji 10 sekund. Neotírejte místo vpichu. Můžete místo vpichu zakrýt malou náplastí, pokud krvácení pokračuje.

Jak mám zlikvidovat použitou předplněnou injekční stříkačku přípravku Kesimpta?

Krok 15. Vyhod'te použitou předplněnou injekční stříkačku do nádoby na ostré předměty (tj. do uzavíratelné nádoby odolné proti propíchnutí apod.) (**viz obrázek J**).

- Použitou předplněnou injekční stříkačku **nevyhazujte** do domácího odpadu.
- Nikdy se nepokoušejte znovu použít předplněnou injekční stříkačku.

Uchovávejte nádobu na ostré předměty mimo dosah dětí.

Obrázek J

